

Spadek liczebności populacji bociana białego *Ciconia ciconia* w powiecie kętrzyńskim

Decline in the white stork *Ciconia ciconia* population size in the Kętrzyn district (NE Poland)

ZBIGNIEW JAKUBIEC¹, UWE PETERSON²

¹ Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Zielonogórski
65–516 Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 1
e-mail: z.jakubiec@wnb.zu.zgora.pl

² D – 25704 Nindorf, Dorfstr. 12, Deutschland
e-mail: nosretepewu@aol.com

Słowa kluczowe: bocian biały, dynamika populacji, badania długookresowe, kolonie bocianie, kętrzyńskie, NE Polska.

Stan populacji bociana białego w rejonie Kętrzyna jest badany od 1974 roku co pięć lat. Obszar ten reprezentuje najwyższe zagęszczenia tego gatunku w skali europejskiej. W ciągu 30 lat, w okresie 1974–2004 odnotowywano wzrost liczebności wynoszący 35%. Ostatnia kontrola w 2010 roku wykazała spadek liczby par sięgający 25% – zwłaszcza w odniesieniu do tzw. kolonii bocianich w północnej części regionu, gdzie liczba par zmalała o ponad połowę. Wynik ten jest o tyle reprezentatywny, że oba porównywane lata 2004 i 2010 cechował podobny efekt lęgowy.